

Mathématique Élémentaire

Test n° 5

(12 octobre 2009)

Correction

Question 1. Résolvez le système suivant en fonction du paramètre réel λ :

$$\begin{cases} \lambda x - y = 2 \\ x + (\lambda - 2)y = \lambda - 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

La matrice augmentée du système est

$$\left(\begin{array}{cc|c} \lambda & -1 & 2 \\ 1 & \lambda - 2 & \lambda - 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Appliquons des transformations élémentaires sur les lignes de cette matrice :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & \lambda - 1 \\ \lambda & -1 & 2 \end{array} \right) \quad L_1 \leftrightarrow L_3$$
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & \lambda - 2 \\ 0 & -1 - \lambda & 2 - \lambda \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1, \\ L_3 \leftarrow L_3 - \lambda L_1 \end{array}$$

Appelons M cette dernière matrice.

Si $\lambda \neq 3$: alors on a

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{\lambda - 2}{\lambda - 3} \\ 0 & -1 - \lambda & 2 - \lambda \end{array} \right)$$

- Si $\lambda \neq -1$, on peut diviser la troisième ligne par $-1 - \lambda$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{\lambda - 2}{\lambda - 3} \\ 0 & 1 & \frac{2 - \lambda}{-1 - \lambda} \end{array} \right)$$

Le système admet alors une solution ssi $\frac{\lambda - 2}{\lambda - 3} = \frac{2 - \lambda}{-1 - \lambda}$ ssi $-\lambda - \lambda^2 + 2 + 2\lambda = 2\lambda - \lambda^2 - 6 + 3\lambda$ ssi $4\lambda = 8$ ssi $\lambda = 2$. Donc si $\lambda = 2$, les lignes 2 et 3 donnent $y = 0$ et, en remplaçant dans l'équation $x + y = 1$ qui provient de la première ligne, on obtient $x = 1$. L'ensemble des solutions est donc $\{(1, 0)\}$.

Si $\lambda \neq 2$, le système est impossible et l'ensemble des solutions est \emptyset .

- Si $\lambda = -1$, la matrice devient :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

La dernière ligne correspond à l'équation $0x + 0y = 3$. Le système est donc impossible et l'ensemble des solutions est \emptyset .

Si $\lambda = 3$: alors la matrice M s'écrit

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -1 \end{array} \right).$$

La deuxième ligne correspond à l'équation $0x + 0y = 1$. Le système est donc impossible et l'ensemble des solutions est \emptyset .

Question 2. Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrez, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\sum_{k=0}^n t^k = \frac{1-t^{n+1}}{1-t}$$

Cas de base : $n = 0$. Dans ce cas, le premier membre devient $\sum_{k=0}^0 t^k = t^0 = 1$ et le second membre

devient $\frac{1-t^{0+1}}{1-t} = \frac{1-t}{1-t} = 1$. L'égalité est donc prouvée.

Hypothèse de récurrence : supposons que l'égalité est prouvée pour tout $n \leq l$ avec $l \geq 0$ et montrons qu'elle est encore vérifiée pour $n = l + 1$. Nous devons montrer que $\sum_{k=0}^{l+1} t^k = (1-t^{l+2})/(1-t)$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{l+1} t^k &= \left(\sum_{k=0}^l t^k \right) + t^{l+1} \\ &= \frac{1-t^{l+1}}{1-t} + t^{l+1} \\ &= \frac{1-t^{l+1} + t^{l+1} - t^{l+1} \cdot t}{1-t} \\ &= \frac{1-t^{l+2}}{1-t} \end{aligned}$$

On a donc prouvé l'égalité pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 3. Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. On définit la trace de A , notée $\text{tr}A$, par $\text{tr}A := \sum_{i=1}^n A_{ii}$. Soit $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice définie par

$$M_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \neq j \\ 2^i & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculez la trace de M . Expliquez votre démarche.

Par définition, $\text{tr}M = \sum_{i=1}^n M_{ii} = \sum_{i=1}^n 2^i$. Par la question 2,

$$\sum_{i=1}^n 2^i = \sum_{i=0}^n 2^i - 2^0 = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} - 1 = 2^{n+1} - 1 - 1 = 2^{n+1} - 2$$

Question 4. Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on définit les ensembles suivants :

$$\begin{aligned} U_n &:= \{z \in \mathbb{C} \mid z \text{ est une solution de } z^n = 1\} \\ A &:= \{z \in \mathbb{C} \mid z \text{ est solution de l'équation } z^n = i\} \\ B &:= \left\{ u \cdot \text{cis} \frac{\pi}{2n} \mid u \in U_n \right\} \end{aligned}$$

Montrez que $A = B$.

Prouvons d'abord que $B \subseteq A$, c'est-à-dire que tout élément de B est un élément de A . Soit $u \text{cis} \frac{\pi}{2n}$, un élément quelconque de B . On a $(u \text{cis} \frac{\pi}{2n})^n = u^n \text{cis} \frac{\pi}{2}$ (règles sur les exposants et formule de De Moivre). Par hypothèse, $u \in U_n$, donc $u^n = 1$. On a donc montré que $(u \text{cis} \frac{\pi}{2n})^n = i$ (car $\text{cis} \frac{\pi}{2} = i$), c'est-à-dire que $u \text{cis} \frac{\pi}{2n}$ est solution de l'équation $z^n = i$ et donc, par définition de A , $u \text{cis} \frac{\pi}{2n}$ est un élément de A .

Réciproquement, soit un élément quelconque de A , c'est-à-dire une solution z de $z^n = i$; montrons que cet élément est un élément de B , c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme $u \text{cis} \frac{\pi}{2n}$ pour un certain $u \in U_n$. Comme $z = (z \cdot (\text{cis} \frac{\pi}{2n})^{-1}) \cdot \text{cis} \frac{\pi}{2n}$, on pose $u := z \cdot (\text{cis} \frac{\pi}{2n})^{-1}$. On a $u^n = (z(\text{cis} \frac{\pi}{2n})^{-1})^n = z^n ((\text{cis} \frac{\pi}{2n})^n)^{-1} = i^{-1} \cdot i$ (par hypothèse). Donc $u^n = 1$, c'est-à-dire qu'on a écrit z sous la forme $u \cdot \text{cis} \frac{\pi}{2n}$ avec u racine n^{e} de l'unité. Donc $z \in B$.

Question 5. Prouvez que, pour tout $x, a \in \mathbb{R}$, on a l'équivalence $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \wedge x \leq a$.

Distinguons deux cas. Tout d'abord considérons les $x \geq 0$.

- (\Rightarrow) Si $|x| \leq a$ alors on a forcément que $a \geq 0$ (puisque $|x| \geq 0$) et donc $-a \leq 0 \leq x$ et $x = |x| \leq a$.
- (\Leftarrow) Si $-a \leq x \wedge x \leq a$ alors $|x| = x \leq a$.

Montrons maintenant les deux implications pour $x < 0$.

- (\Rightarrow) Si $|x| \leq a$ alors $a \geq 0$ et donc $-x = |x| \leq a$, ce implique $x \geq -a$. De plus, $x \leq 0 \leq a$.
- (\Leftarrow) Si $-a \leq x \wedge x \leq a$ alors $|x| = -x \leq -(-a) = a$.

Question 6. Écrivez les deux ensembles suivants sous la forme d'une union d'intervalles disjoints.

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3 \wedge (x \leq 1 \vee x \geq 7)\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x \leq 3 \wedge x \leq 1) \vee x \geq 7\}$$

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1 \vee x \geq 7\}$$

$$=]-\infty, 3] \cap (]-\infty, 1] \cup [7, +\infty[)$$

$$=]-\infty, 1]$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3 \wedge x \leq 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 7\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 7\}$$

$$=]-\infty, 1] \cup [7, +\infty[$$

Question 7. Écrivez l'ensemble des solutions de l'inéquation

$$\frac{1 + |x|}{|x + 2|} \geq 1 \tag{1}$$

sous la forme d'une union disjointe d'intervalles (moins il y en a, mieux c'est).

Condition d'existence : Pour que la fraction aie un sens, il faut que son dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire que $|x - 2| \neq 0$ i.e. $x + 2 \neq 0$ i.e. $x \neq -2$.

Résolution : Comme $|x + 2| \geq 0$ on peut multiplier les deux membres de (1) par cette quantité sans en changer le sens. On obtient alors

$$1 + |x| \geq |x + 2|.$$

Par la relation de la question 5, ceci est équivalent à

$$-1 - |x| \leq x + 2 \quad \text{et} \quad x + 2 \leq 1 + |x|$$

ou encore

$$|x| \geq -x - 3 \quad \text{et} \quad x + 1 \leq |x|.$$

Par la relation $|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \wedge x \geq a$, ceci devient

$$\underbrace{(x \leq x + 3 \text{ ou } x \geq -x - 3)}_{\text{toujours vrai}} \text{ et } \underbrace{(x \leq -x - 1 \text{ ou } x \geq x + 1)}_{\text{toujours faux}}.$$

Comme le premier terme est toujours vrai quel que soit $x \in \mathbb{R}$, le « ou » de gauche l'est aussi et, par conséquent, le « et » se réduit au membre de droite (« vrai \wedge P » est équivalent à « P »). Comme le dernier terme est faux quel que soit $x \in \mathbb{R}$, l'expression se réduit à $x \leq -x - 1$ c'est-à-dire $x \leq -\frac{1}{2}$. En conclusion

$$(1) \Leftrightarrow x \leq -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x \in \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right[.$$

Question 8. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathbb{R}^{p \times p}$. Prouvez par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, on a

$$(A_1 \cdot A_2 \cdots A_n)^t = A_n^t \cdots A_2^t \cdot A_1^t. \quad (2)$$

Le cas de base, $n = 1$, affirme que $(A_1)^t = A_1^t$. C'est trivialement vérifié.

Étape de récurrence : Supposons que l'égalité (2) soit vérifiée pour tous les naturels $n \leq k$ (avec $k \geq 1$) ; prouvons que, sous cette hypothèse de récurrence, l'égalité (2) est vérifiée pour $n = k + 1$, c'est-à-dire que

$$(A_1 A_2 \cdots A_k A_{k+1})^t = A_{k+1}^t A_k^t \cdots A_2^t A_1^t.$$

On a :

$$\begin{aligned} (A_1 A_2 \cdots A_k A_{k+1})^t &= ((A_1 A_2 \cdots A_k) A_{k+1})^t && \text{associativité du produit matriciel} \\ &= A_{k+1}^t (A_1 A_2 \cdots A_k)^t && \text{car } (AB)^t = B^t A^t \\ &= A_{k+1}^t (A_k^t \cdots A_2^t A_1^t) && \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= A_{k+1}^t A_k^t \cdots A_2^t A_1^t && \text{associativité du produit matriciel} \end{aligned}$$